COMMENT APPREHENDER UNE DOULEUR CHRONIQUE ?

Dr Pavlos Petit

Hôpital Saint Vincent de Paul, Lille (GHICL)

« Rien de ce qui est vivant n'est achevé à proprement parler »

DEFINITION

La douleur est une expérience désagréable, sensorielle et émotionnelle, associée ou ressemblant à ce qui est associé à une lésion tissulaire réelle ou potentielle.

IASP, 2020

DOULEUR AIGUE SIGNAL D'ALARME

alamy

Image ID: MMX1DW
www.alamy.com

Un jeune ouvrier de 29 ans tombe sur un clou de 15 cm qui lui transperce la chaussure. Il arrive aux urgences, le moindre mouvement du clou le fait hurler de douleur. Analgésie par Fentanyl, sédation par Midazolam.

*Fisher JP, Hassan DT, O'Connor
N. Minerva. BMJ. 1995 Jan*

QUEL EST LE MECANISME DE LA DOULEUR ?

LA DOULEUR N'A PAS DE CENTRE

AIRES SOMESTHESIQUES S1 ET S2
(composante sensorielle)

AMYGDALE

PRE-FRONTAL

INSULA

CORTEX CINGULAIRE ANTERIEUR
(composante émotionnelle et
cognitive)

4 composantes de la douleur

SENSORI-DISCRIMINATIVE : ce que je sens

EMOTIONNELLE : ce que je ressens

COGNITIVE : ce que je pense

COMPORTEMENTALE : ce que je fais

LA DOULEUR N'A PAS DE CENTRE

SIGNE DE DANGER

SIGNIFIANTE, CONNOTEE

SUBJECTIVE

RELATIVE

alamy

Image ID: 2E7F1X7
www.alamy.com

4 GRANDS TYPES DE DOULEURS

PAR EXCES DE NOCICEPTION : lésion tissulaire

NEUROPATHIQUES : lésion du système nerveux sensoriel (périphérique ou central)

PSYCHOGENES : expression somatique d'une souffrance psychique

NOCIPLASTIQUES : dysfonction de la modulation du signal douloureux (céphalées de tension, syndrome du colon irritable, syndrome fibromyalgique, certaines douleurs pelviennes chroniques...)

=> **SOUVENT MIXTES**

DOULEURS CHRONIQUES

Au moins 3 mois

30 % population française

Impact majeur

Une maladie en soi

Caractère inutile, destructeur

DOULEURS CHRONIQUES : COMMENT ?

LESION – STIMULUS NOCICEPTIF PERSISTANT

LESION DES VOIES NEUROLOGIQUES
NOCICEPTIVES : douleurs neuropathiques

SENSIBILISATION DU SYSTÈME NERVEUX

DOULEURS CHRONIQUES : COMMENT ?

BESOIN -> DEMANDE / PLAINTE

CONTEXTE D'APPARITION

CHARGÉE DE SENS

PHENOMENE COMPLEXE ET MULTIFACTORIELS

DOULEURS NEUROPATHIQUES

Définition : liées à une lésion ou maladie du système somatosensoriel

Périphériques : tronc nerveux, ganglion sensitif, plexus, racine

Centrales : moelle épinière, cerveau

Environ 7 % de la population générale

ETIOLOGIES DES DOULEURS NEUROPATHIQUES

SEMIOLOGIE DOULEUR NEUROPATHIQUE

CONTEXTE D'APPARITION

DESCRIPTION DES DOULEURS :

- Rythme continue et/ou paroxystique
- Survenue spontanée et/ou provoquée
- Type : **brûlures, froid douloureux, décharges électriques, étau, crampes, coups de poignard**
- Sensations associées : **fourmillements, picotements, engourdissement, démangeaisons**
- **Territoire neurologique systématisé**
- Examen clinique : signes négatifs (**hypoesthésie**) ou positifs (**allodynie**)

DIAGNOSTIC CLINIQUE / Paraclinique à discuter (EMG, IRM, PES)

DN 4 : QUESTIONNAIRE DE DEPISTAGE

Interrogatoire du patient

Question 1 : la douleur présente-t-elle une ou plusieurs des caractéristiques suivantes?

1. Brûlures
2. Sensation de froid douloureux
3. Décharges électriques

Question 2 : la douleur est-elle associée dans la même région à un ou plusieurs des symptômes différents?

4. Fourmillements
5. Picotements
6. Engourdissements
7. Démangeaisons

Examen du patient

Question 3 : la douleur est-elle localisée dans un territoire où l'examen met en évidence?

8. Une hypoesthésie au tact
9. Une hypoesthésie à la piqûre

Question 4 : la douleur est-elle provoquée par?

10. Le frottement

(Adapté de Bouhassira D, et coll. Comparison of pain syndromes associated with nervous or somatic lesions and development of a new neuropathic pain diagnostic questionnaire (DN4). Pain 2005;114:29-36).

CEPHALEES CHRONIQUES

© Lantéri-Minet M. Rev Prat Med Gen 2016;30(956):144.

SYNDROME FIBROMYALGIQUE

La Fibromyalgie
Il y a ce qui paraît
Et ce qui est...

DOULEURS CHRONIQUES : axiales, membres

ASTHENIE

TROUBLES DU SOMMEIL

TROUBLES COGNITIFS (attentionnels)

SYMPTÔMES ASSOCIES : céphalées, troubles fonctionnels intestinaux, dysménorrhées, instabilité vésicale

- Depuis 3 mois

Questionnaire FiRST

- Au moins 5 items / 6

	Oui	Non
Mes douleurs sont localisées partout dans tout mon corps		
Mes douleurs s'accompagnent d'une fatigue générale permanente		
Mes douleurs sont comme des brûlures, des décharges électriques ou des crampes		
Mes douleurs s'accompagnent d'autres sensations anormales comme des fourmillements, des picotements ou des sensations d'engourdissement, dans tout mon corps		
Mes douleurs s'accompagnent d'autres problèmes de santé comme des problèmes digestifs, des problèmes urinaires, des maux de tête, ou des impatiences dans les jambes		
Mes douleurs ont un retentissement important dans ma vie : en particulier, sur mon sommeil, ma capacité à me concentrer avec une impression de fonctionner au ralenti		

Références bibliographiques :

- Burckhardt CS, Clark SR, Bennett RM. Fibromyalgia and quality of life : a comparative analysis. J Rheumatology 1993 ; 20:475-9.
- Perrot S, Bouhassira D, Fermanian J. Cercle d'Etude de la Douleur en Rhumatologie. Development and validation of the Fibromyalgia Rapid Screening tool (FiRST). Pain. 2010 ; 150:250-6
- Perrot S, Dumont D, Guillemain F, Pouchot J, Coste J. For the French group of quality of life research. Quality of life in women with fibromyalgia syndrome : validation of the QIF, the French version of the fibromyalgia impact questionnaire. J Rheumatol 2003 ; 30:1054-59

QUELLES APPROCHES ?

Du regard à l'écoute

Reconnaissance

Double écoute

Φαρμάκον

PRINCIPES GENEREAUX

*Qualité **relationnelle** – effet placebo*

*Traiter et **vite et bien** la douleur aigüe*

*Définir les **objectifs** en fonction des attentes du patient*

*Traiter selon le **mécanisme physiopathogénique** de la douleur*

***Réévaluer** la tolérance (pharmakon) et l'efficacité du traitement*

***Prévenir la douleur** et sa réapparition (formes LP, prévention des douleurs liées aux soins)*

*Veiller à l'**autonomie du patient**, sa lucidité (éviter les effets sédatifs, privilégier la voie orale)*

Classification de Lussier-Beaulieu :

La classification des antalgiques sous forme de paliers (Paliers I, II et III), promue par l'OMS à la fin des années 80, tend à être remplacée par une taxonomie plus moderne : la classification de Lussier-Beaulieu^{(1),(2)}. Elle distingue :

Les antalgiques anti-nociceptifs

Douleurs nociceptives

- ▶ Non-opioides : paracétamol, AINS.
- ▶ Opioides : morphine, oxycodone, hydromorphone, fentanyl.
- ▶ Cannabinoïdes.

Les anti-hyperalgésiques

Douleurs neuropathiques centrales ou autres situations hyperalgiques

- ▶ Antagonistes des récepteurs NMDA-acideN-méthylD-aspartique : kétamine.
- ▶ Antiépileptiques gabapentinoïdes : gabapentine, prégabaline, lamotrigine.
- ▶ Nefopam.

Les modulateurs des contrôles descendants inhibiteurs

Douleurs neuropathiques

- ▶ Antidépresseurs tricycliques.
- ▶ Inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline.

Les modulateurs de la transmission et de la sensibilisation périphérique

Douleurs neuropathiques périphériques

- ▶ Anesthésiques locaux : lidocaïne, notamment.
- ▶ Carbamazépine, oxcarbazépine, topiramate.
- ▶ Capsaïcine.

Les antalgiques à effets mixtes | Antalgiques anti-nociceptifs et modulateurs des contrôles inhibiteurs ou excitateurs descendants, douleurs mixtes nociceptives et neuropathiques

- ▶ Tramadol.
- ▶ Tapentadol.

CLASSIFICATION

Anti-nociceptifs :

- non opioïdes (Paracétamol, AINS, Nefopam)
- Opiïdes faibles et forts

Anti-neuropathiques : antiépileptiques (Gabapentine), antidépresseurs, topiques locaux

Anti-hyperalgésiant : Nefopam, Ketamine, Gabapentine

Par quels enzymes l'opioïde est-il éliminé ?	Cytochromes (2D6 et/ou 3A4)		Autres enzymes (UGT...)
Opioïdes concernés	Codéine Oxycodone Tramadol	Fentanyl Méthadone	Hydromorphone Morphine Tapentadol
Donne-t-il des métabolites actifs ?	Oui (via 2D6)	Non	Oui ou Non

Importance of Cyp 2D6

Oxidation of >50 drugs

Analgesics
(pain killers)

Beta Blockers
(cardiovascular diseases)

Inhibited by drugs

Quinidine
(heart rhythm disturbance)

fluoxetine
(depression)

Fig. 2 – Proposed therapeutic algorithm for neuropathic pain treatment in adults. Only treatments available in France in June 2019 were considered. For practical considerations, see Table 4. NP: neuropathic pain; TCAs: tricyclic antidepressants; TENS: transcutaneous electrical nerve stimulation; HF-rTMS: high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation; M1: primary motor cortex; BTX-A: botulinum toxin type A; FBSS: failed back surgery syndrome; MME: mg morphine equivalent.

TRAITEMENTS DES DOULEURS NEUROPATHIQUES

Topiques locaux

- Patch de Lidocaïne
- Patch de Capsaïcine

Toxines botuliques

TRAITEMENTS DES DOULEURS NEUROPATHIQUES

Neurostimulation

- Externe
- Médullaire
- Transcrânienne

THERAPIES NON MEDICAMENTEUSES

Psychothérapie

Hypnose

Méditation pleine conscience

Sophrologie

Acupuncture

STRUCTURES DOULEUR CHRONIQUE

« Faire craquer les normes et en instituer de nouvelles » G.Canguilhem

sempé.